

LAGARTIJAS DE PARED DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Género *Podarcis*

José R. Castelló

LAGARTIJA DE BOCAGE

Lagartixa-de-bocage
Podarcis bocagei



LCC 7 cm. Dorso verde (marrón fuera del celo). Líneas dorsolaterales verdes-amarillas, de bordes irregulares, rodeadas de negro; discontinuas por lo general en los machos. Segunda línea blanca más tenue en la parte inferior de los costados. Normalmente sin línea vertebral. Costados marrones o negros con numerosas manchas dispersas blanquecinas a marrones. Sin ocelos azules. Vientre marillo, ocasionalmente naranja.

LAGARTIJA DE CARBONELL

Lagartixa-de-carbonell
Podarcis carbonelli



LCC 5 cm. Dorso marrón (verde en machos en celo). Líneas dorsolaterales discontinuas, verde intenso en machos, blanquecinas en hembras, de bordes irregulares, bordeadas de negro hacia la parte trasera. Sin líneas vertebrales. Flancos con manchas verdes o amarillas, de color más claro que el dorso. Escamas ventrales externas azules en machos en celo. Vientre blanco o amarillento. Hembras de color más discreto, sin escamas azules.

LAGARTIJA LUSITANA

Lagartixa-do-noroeste
Podarcis guadarramae



LCC 6 cm. Marrón o verde, dorso y costados con pigmentación oscura (reticulada o moteada), separados en hembras por una línea dorsolateral pálida o en machos por una hilera de manchas alargadas. El vientre nunca es amarillo. Cabeza aplanada, hocico alargado. Hembra más pequeña y menos reticulada. No tiene escamas ventrales externas azules.

LAGARTIJA IBÉRICA

Lagartixa-ibérica
Podarcis hispanicus



LCC 5 cm. La especie de *Podarcis* más pequeña. Dorso marrón (nunca verde). Línea vertebral, con frecuencia doble en la parte más anterior. Líneas dorsolaterales que continúan por la cabeza. Sin escamas ventrales externas azules.

LAGARTIJA VERDOSA

Lagartixa esverdeada
Podarcis virescens



LCC 7 cm. Dorso verdoso, con pigmentación menos oscura que *P. guadarramae*. Bandas laterales oscuras (llamativas en la hembra). Escamas ventrales externas azules. Machos menos aplanados y con menos manchas oscuras que *P. guadarramae*, manchas dorsolaterales más redondas y menos alargadas. Sin línea vertebral. Vientre amarillo. Hembra más scora. Difícil de distinguir de *P. vaucheri*.

LAGARTIJA ANDALUZA

Lagartixa andaluza
Podarcis vaucheri



LCC 6 cm. Machos con dorso verde, cuello marrón, cabeza grisácea. Líneas dorsolaterales discontinuas, irregulares, verdes o amarillas, mal definidas o ausentes, formada por manchas separadas, bordeadas por un área marrón o negra en la parte superior de los costados. Sin líneas vertebrales. Generalmente sin escamas ventrales azules. Vientre blanco a naranja, a veces manchas negras en garganta y parte inferior de flancos.

LAGARTIJA ROQUERA

Lagartixa-dos-muros
Podarcis muralis



LCC 6 cm. Dorso marrón o grisáceo. Líneas dorsolaterales pálidas por encima del costado oscuro en las hembras, machos uniformemente reticulados por todo el cuerpo. Vientre blanco a naranja, con frecuencia punteado, con manchas más grandes en los machos. Escala masetérina generalmente bien marcada. Es más grande y robusta que las otras *Podarcis*.

LAGARTIJA ITALIANA

Lagartixa-italiana
Podarcis siculus



SVL 9 cm. Especie invasora. Dorso verde, marrón en la parte posterior. Líneas o bandas dorsolaterales, a veces reticuladas. Escamas ventrales externas azules. Ocelo azul sobre la raíz de las patas delanteras. Vientre sin manchas, blanco o verdoso (no naranja). Garganta sin manchas.

LAGARTIJA PARDA


Lagartixa-catalã
Podarcis liolepis



LCC 7 cm. Dorso marrón o grisáceo, a veces verde intenso. Línea vertebral oscura, con frecuencia discontinua. Vientre rosa, rojo ladrillo o blanco (nunca amarillo). Generalmente escama masetérina. A veces líneas dorsolaterales (discontinuas, formadas por manchas en los machos, generalmente continuas en hembras. Escamas ventrales externas azules.

LAGARTIJA DE LAS PITIUSAS

Lagartixa-do-I biza
Podarcis pityusensis



LCC 9.5 cm. Coloración muy variable. Dorso generalmente verdoso con punteado negro. Costado marrón, rojizo, o azul. Puede tener líneas dorsolaterales. Escamas dorsales hexagonales alargadas, aquilladas, lo que la distingue de *P. lilfordi*. Es la única lagartija de pared que existe en Ibiza y Formentera.

LAGARTIJA BALEAR

Lagartixa-das-Balears
Podarcis lilfordi



LCC 8 cm. Coloración muy variable, rayada, reticulada o uniforme. Dorso generalmente marrón o verdoso con punteado negro, pero puede ser uniforme y menos colorido. Costado marrón, rojizo o azul. A veces líneas dorsolaterales pálidas y varias rayas oscuras a lo largo de la espalda. Escalas dorsales redondeadas y lisas, no aquilladas. Vientre blanco a rosado.